





# 학생별 증상 판단 트리

잠재적인 COVID-19 증상 또는 노출과 관련하여 전체 학생 선별검사

저위험: 일반 증상

고위험: 경고 증상

 열 (>100.4°F)	 인후통	 기침
 울혈/콧물	 두통	 호흡 곤란
 메스꺼움/구토/설사	 피로/근육통 또는 몸살	 입맛 없음/후각 상실

## COVID-19 확진자와 접촉하셨습니까?

밀접 접촉: 6 피트 (1.8m) 이내의 거리에서 15 분 이상

아

저위험 증상

≤ 2 개의 저위험 증상  
또는 1 개의 고위험 증상



자택 귀가

자택 귀가



증상이 해결되고 24 시간 후에 학교로 복귀 (해열제 미복용)

의사 검진

1

의사가 증상에 대한 대체 진단을 확정합니다. 의사의 소견이 파일에 기록되어 있어야 합니다. SARS-CoV-2 PCR 검사는 필요하지 않습니다.



열이 없고 증상이 완화되면 24 시간 후에 학교로 복귀

2

음성 SARS-CoV-2 PCR 검사.



열이 없고 증상이 완화되면 24 시간 후에 학교로 복귀

3

양성 SARS-CoV-2 PCR 검사 또는 의사의 진료 또는 검사를 받지 않음.



증상이 발생한 후 10 일 이후에 24 시간 동안 열이 없는 경우에만 학교에 복귀하십시오. 확진 사례의 경우 밀접 접촉을 격리하십시오. 질문이 있는 경우 HCA에 문의하십시오.

예



자택 귀가\*



증상이 발생한 후 10 일 이후에 24 시간 동안 열이 없는 경우에만 학교에 복귀하십시오. 확진 사례의 경우 밀접 접촉을 격리하십시오. 질문이 있는 경우 HCA에 문의하십시오.

\*OC HCA(Health Care Agency)에 문의



본 관리 지침은 교직원을 지원하기 위해 설계되었으며 의사의 결정을 대체하거나 특정 상태의 모든 환자를 대상으로 하는 계획서를 구성하지 않습니다.. 진단 및 치료는 자격을 갖춘 의료진의 밀접한 감독하에 수행되어야 합니다. 가이드라인은 2020년 9월 12일에 변경될 수 있습니다